


Familia Laniidae  
**ALCAUDÓN REAL**  
*Lanius meridionalis*



**IDENTIFICACIÓN**

Paseriforme de tamaño medio, corpulento y colilargo. Suele posarse en las ramas más altas de los árboles y arbustos. Las partes superiores son grises y negras, con finas marcas blancas en la ceja, el manto y la base de las primarias externas. Las partes inferiores son de color rosado **1** excepto la garganta que es de color blanco puro. La cola es negra con los bordes blancos. La cabeza es muy grande, con un antifaz negro **2** y el pico robusto y terminado en gancho **3**. Ambos sexos son muy parecidos. El joven del alcaudón real es casi una réplica del adulto, salvo por una línea blanca en el extremo de las plumas cobertoras mayores y una coloración en general más apagada, aunque el rosado del pecho y vientre está presente.

**ESPECIES SIMILARES**

Se puede confundir con los jóvenes de alcaudón común, aunque los de alcaudón real son de mayor tamaño y plumaje más liso.

**DÓNDE VERLA**

Es una especie que busca espacios abiertos tanto en alta montaña como en zonas de estepa, aunque siempre en bajas densidades. En la provincia de Málaga sobre todo ocupa la vega de Antequera y la serranía de Ronda.

**CUÁNDO VERLA**

**ESTATUS RESIDENTE**

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

