



Lobito jaspeado


Pyronia cecilia (Vallantin, 1894)

DESCRIPCIÓN

Envergadura alar: de 3 a 3,6 cm. **Alas cerradas:** el ala trasera es gris, abundantemente jaspeada de marrón; tiene una zona más clara que ocupa buena parte del ala, con forma de "Y" y un abultamiento mirando al interior. El ala delantera es naranja, con un ocelo doble fusionado y borde ancho gris y marrón. **Alas abiertas:** no es normal encontrarla así. Ambos sexos color naranja con bordes anchos marrones y ocelo doble con forma de 8; la hembra carece de punto blanco cerca del ángulo anal del ala trasera y el macho tiene con una mancha marrón en el centro del ala delantera (androconia), claramente surcada por la venación naranja.

CLAVE VISUAL DE IDENTIFICACIÓN

Doble ocelo fusionado, con forma de 8



Borde ancho marrón y gris jaspeado

Mancha clara con forma de Y, con abultamiento en parte interior

Borde ancho marrón

Doble ocelo fusionado, con forma de 8

HEMBRA

MACHO



Bordes anchos marrones

Ausencia de punto blanco



ESPECIES PARECIDAS

Abierta, posible confusión con: **lobito agreste**, pero la hembra tiene un punto pequeño en la zona anal del ala trasera y la androconia del macho no está surcada por la venación naranja; **lobito listado**, pero ambos sexos tienen una serie de ocelos en el ala trasera.



BIOLOGÍA Y HÁBITAT

Vuela desde mayo hasta septiembre, más abundante en los tres primeros. Una sola generación anual. Vive en hábitats abiertos, forestales y de matorral, olivares y almendrales abandonados, más común y abundante en aquellos que tengan gran cantidad de gramíneas y no sean especialmente agrestes. Precisamente de las gramíneas se alimentan sus orugas, en concreto de las del género *Brachypodium*.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DISTRIBUCIÓN

Solo falta en las etapas costeras de la GSM, si bien en la 3 y 4 está presente de manera escasa y localizada, al igual que en las del norte provincial.

