


BUSARDO RATONERO

Buteo buteo



Isabel Gómez



Isabel Gómez

IDENTIFICACIÓN

De un tamaño similar a la calzada, se caracteriza por su forma rechoncha cuando está posada, por tener las alas relativamente anchas y redondeadas y por presentar una coloración variable; hay individuos muy claros y otros prácticamente oscuros. No obstante, el plumaje más típico es el de color marrón, con tonalidades más pálidas en la región ventral, donde aparece una franja pectoral más clara y de extensión variable. En vuelo es frecuente que abra la cola en abanico y se hacen patentes unas ventanas claras en primarias y parte de las secundarias.

DÓNDE VERLA

Aunque es una especie poco exigente con respecto al hábitat, el ratonero está típicamente ligado a ambientes con un mínimo de cobertura arbórea. En Málaga lo podemos ver en zonas forestales densas, pero también en los ambientes adheridos de la vega de Antequera y serranía de Ronda. Además, en invierno recibimos ejemplares de latitudes más septentrionales que pueden ocupar todo tipo de paisajes abiertos.

CÓMO VIVE

Su nombre se debe a su predilección por los micromamíferos, si bien la alimentación es muy variada y va desde invertebrados hasta vertebrados de tamaño medio. Es típico observarlo en posaderos de baja altura, desde donde espera al acecho a sus presas. En el norte peninsular es bastante más abundante que aquí en el sur.

CUÁNDO VERLA

Puede observarse a lo largo de todo el año, aunque en invierno ocupa más ambientes y resulta más fácil su observación, por ocupar zonas abiertas donde resulta más sencilla su localización. Hace unas décadas era relativamente frecuente durante los periodos de migración, si bien en la actualidad sus viajes se han reducido en gran medida y los casos de cruce al continente africano son muy escasos. Es muy típico su reclamo, el cual puede recordar a un maullido.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ESPECIES SIMILARES

Un error típico de identificación es la confusión que se genera entre el busardo ratonero y el abejero europeo (*Pernis apivorus*), especialmente cuando se observan individuos aislados.