



Mariposa del madroño

Charaxes jasius (Linnaeus, 1767)

DESCRIPCIÓN

También conocida como baja o cuatro colas. Envergadura alar: 6,2 a 8,5 cm. **Alas cerradas:** destaca el llamativo diseño de bandas rojas, marrones y blancas, una ancha blanca cruzándole ambas alas y los bordes posteriores anaranjados o amarillentos, con dos apéndices en cada ala trasera y manchas azules en esta misma ala. **Alas abiertas:** marrón con anchas franjas naranjas o amarillentas en el borde exterior, con manchas azules en el ala trasera y dos apéndices en cada una de ellas.

CLAVE VISUAL DE IDENTIFICACIÓN

Franjas rojas, marrones y blancas



Borde anaranjado o amarillento

Dos apéndices en cada ala

Foto: José Antonio Ríos Bosquet

Franja blanca y ancha

Manchas azules



Bordes naranja o amarillento

Dos apéndices en cada ala

Manchas azules



ESPECIES PARECIDAS

Imposible confundirla con otra especie, tanto posada como en vuelo, debido a su tamaño, diseño y coloración.

BIOLOGÍA Y HÁBITAT

Dos generaciones anuales, volando desde marzo a noviembre, si bien es más común de ver en junio, julio y agosto y, ocasionalmente si la temporada ha sido buena para ella, en octubre.

Mariposa propia de alcornoques bien conservados, bosques de ribera u otros lugares con abundancia de madroños (*Arbutus unedo*), planta nutricia de sus orugas. Tiene un marcado carácter dispersivo y migrador, por lo puede encontrarse casi en cualquier hábitat forestal y de montaña, incluida cumbres, pues es asidua del *hilltopping*. Tiene un vuelo potente, directo y planeador, que puede parecer al de un ave. De vez en cuando se acerca a las personas, a las que rodea, para continuar con su camino. Gusta de parar en ramas medias y altas de árboles y arbustos, donde puede pasar minutos tomando el sol de la mañana.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DISTRIBUCIÓN

Conocida solo de cuatro etapas de la GSM, concretamente las que transcurren por la cuenca del río Genal y las sierras Alpujata y Mijas. Sin embargo, dado su carácter migrador y sus preferencias de hábitat, sin duda ha de estar en casi todas las etapas del occidente malagueño. No se descartan observaciones puntuales en las sierras Tejeda y Almijara, donde es muy escasa y localizada. Toda cita de la especie en la mitad oriental y el norte de la provincia es de sumo interés, por lo que se ruega sean comunicadas al autor de esta guía.

