


Familia Sylviidae

CURRUCA CARRASQUEÑA*Sylvia cantillans* / *S. inornata*

Macho adulto



Hembra joven

IDENTIFICACIÓN

Ave pequeña e inquieta que presenta distintos plumajes según el sexo y la edad. Machos con el dorso gris pizarra oscuro; una marcada bigotera blanca **1** y la garganta, el pecho y los flancos naranja-rojizos **2**. Las hembras son mucho más pálidas, sobre todo en las partes inferiores y a menudo la bigotera blanca es apenas perceptible. La cola es gris oscuro en ambos sexos con bordes laterales blancos **3**. Durante el otoño, los machos cambian de librea, aclarando la coloración anaranjada-rojiza hasta parecer rosada. Los jóvenes del año son parecidos a las hembras adultas, aún más pálidos en sus partes inferiores y gris-pardusco en las partes superiores. Ambos sexos presentan un anillo ocular rojo, más marcado en los machos, rodeado de blanco **4**, más evidente este último tono en las aves jóvenes.

ESPECIES SIMILARES

Sólo la curruca rabilarga guarda parecido con el plumaje del macho adulto de la curruca carrasqueña. Los plumajes de los jóvenes y las hembras de esta especie pueden ser confundidos con los de las curruca tomillera, zarcera, cabecinegra y mosquitera, si bien ninguna de estas especies reúne las cuatro características descritas en el apartado anterior.

DÓNDE VERLA

Ave de matorral noble como el coscojar, presente sobre todo en las primeras etapas de degradación del bosque mediterráneo y en encinares jóvenes. Durante los pasos migratorios, individuos aislados de esta especie pueden ser observados en ambientes completamente diferentes.

CUÁNDO VERLA**ESTATUS ESTIVAL**

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

