


SERÍN VERDECILLO

Serinus serinus



MACHO

Eduardo Antúnez



HEMBRA

Eduardo Antúnez

IDENTIFICACIÓN

Es el más pequeño de nuestros fringílidos (aprox. 11 cm) y entre sus rasgos distintivos cabe señalar un plumaje en el que predominan los verdes y el amarillo, típicamente estriado en pecho y flancos y un pico cónico, muy corto. El dimorfismo sexual es notable, especialmente durante la primavera, ya que los machos muestran la frente, la garganta y el pecho de color amarillo intenso. Las hembras presentan tonalidades más apagadas, sin amarillo vivo en cabeza y pecho, y un estriado más profuso en el pecho. Los jóvenes son parduzcos y muy rayados. La cola es corta y ahorquillada y el obispillo es amarillo.

DÓNDE VERLA

Especie muy ubicua que ocupa una gran variedad de espacios arbolados abiertos, como campiñas, huertos de frutales, olivares, dehesas, bosquetes, parques y jardines, siendo más escasa en zonas de vegetación densa. Recientemente ha sufrido un proceso de expansión hacia el centro y norte de Europa, tratándose las poblaciones más septentrionales de migradores parciales, que alcanzan la península Ibérica durante los meses invernales.

CÓMO VIVE

Inquieto, canta casi todo el año y es una de las aves forestales que antes comienza a criar, ya a principios del mes de febrero. Realiza dos puestas anuales de 3-4 huevos en un pequeño nido en forma de taza en la arboleda. Desarrolla un cortejo muy vistoso emitiendo su canto mientras realiza un vuelo circular muy errático que recuerda al de un murciélago o al de una mariposa. Su peculiar canto consiste en un gorjeo de notas, que puede recordar al sonido del aceite al freír. Se alimenta principalmente de semillas de herbáceas y de cardos, y en primavera también come brotes de árboles e insectos.

CUÁNDO VERLA

En Málaga es residente.

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

ESPECIES SIMILARES

Verderón (*Chloris chloris*) y lúgano (*Spinus spinus*).