



Veloz de las rieras

Gegenes nostradamus (Fabricius, 1793)

DESCRIPCIÓN

Envergadura alar: 2,5 a 3,2 cm. **Alas cerradas:** gris claro o crema claro, sin dibujos, solo a la hembra le trasluce del interior de las alas delanteras una pequeñas manchas blancas, no siempre apreciables. **Alas abiertas:** no suele mostrarse así, pero cuando lo hace presenta un color marrón oscuro, con algunas manchas blancas las hembras en las alas delanteras.

CLAVE VISUAL DE IDENTIFICACIÓN



Manchas blancas,
solo en hembras



Marrón oscuro,
las hembras con
pequeñas manchas
blancas

ESPECIES PARECIDAS

Veloz fenestrada: rara vez se deja ver de alas abiertas; cerrada, amarillenta con puntos negros, algunos con el centro blanco, en el ala trasera, mientras que en la delantera son más grandes y blancos.



BIOLOGÍA Y HÁBITAT

Vuela durante la primavera y hasta hasta comienzos de otoño, en varias generaciones sucesivas, siendo más común durante el verano y otoño.

Su principal hábitat son los tramos bajos de ríos y arroyos que mantengan secos su cauce buena parte del año, y también sus terrazas fluviales. En menor medida, en las cada vez más escasas dunas y arenales costeros y marismas litorales. Tiene carácter migrador, por lo que se deja ver ocasionalmente en entornos urbanos, a menudo parques y jardines donde liba de plantas ornamentales. Siempre por debajo de los 400 m de altitud.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	díc
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DISTRIBUCIÓN

Conocida de las etapas de menor altitud y costeras de la GSM, siempre escasa y muy localizada, principalmente en tramos bajos de ríos y arroyos secos o de caudal estacional. No se descarta que esté en otros lugares adecuados de las etapas del norte malagueño.

