



# Violetilla


*Zizeeria knysna* (Trimen, 1862)

## DESCRIPCIÓN

Envergadura alar: 1,8 a 2,4 cm. **Alas cerradas:** fondo grisáceo o amarronado; serie de puntos en forma de arco en ambas alas, más anguloso en la trasera; en la delantera, punto en la celda y otro debajo de éste. En ambas alas, presenta la franja entre las series de puntos y el borde, con manchas difuminadas algo más oscuras que el fondo. **Alas abiertas:** raramente muestra el interior. El macho es azulado o violáceo brillante, con el borde ancho y marrón. La hembra tiene menor proporción de azul, pudiendo ser solo un vestigio en el ala delantera.

## CLAVE VISUAL DE IDENTIFICACIÓN

Serie de puntos en forma de arco



Serie de puntos en forma de arco

Borde marrón ancho

MACHO

Azul o morado, mayor amplitud en el macho



## ESPECIES PARECIDAS

**Tomillera y abencerraje:** serie de puntos del ala trasera con el penúltimo desplazado hacia el exterior, dándole forma de "?". Manchas negras bien definidas entre las series de puntos y el borde del ala. Fimbrias ajedrezadas.



## BIOLOGÍA Y HÁBITAT

Vuela durante casi todo el año en zonas bajas y cercanas al mar. Con varias generaciones, es más abundante desde finales de verano. Vive entre la hierba baja que se mantiene húmeda durante buena parte del año, en torno a ríos y arroyos, embalses, estanques y otros lugares húmedos, en terrazas fluviales, bordes y cauces secos. Se ha adaptado a la perfección a los entornos urbanos, especialmente al césped de parques, jardines y campos de golf, siempre que tengan una carga pequeña de biocidas. Esta adaptación se debe a las plantas nutricias de las que se alimentan sus orugas, especies rastreras que prosperan a menudo en el césped, como las leguminosas alfalfas (*Medicago spp.*) y tréboles (*Trifolium spp.*), y de otras familias, el abrojo (*Tribulus terrestris*) y *Glinus lotoides*. Generalmente por debajo de 600 m de altitud.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## DISTRIBUCIÓN

Ámpliamente distribuida por la GSM. Es escasa y localizada en las etapas montañosas y en el norte provincial, mientras que en las etapas más urbanizadas puede ser relativamente abundante, siempre que tengan amplias zonas de césped con poca carga de biocidas.

