



# Piquitos serrana

*Carcharodus flocciferus* (Zeller, 1847)

## DESCRIPCIÓN

Envergadura alar: 3,2 a 3,5 cm. **Alas abiertas:** delantera con una mancha clara internándose por debajo del ápice; trasera con serie de manchas claras muy destacadas. **Alas cerradas:** misma mancha que en ala delantera abierta, y una similar en la trasera; grandes manchas blancas.

## CLAVE VISUAL DE IDENTIFICACIÓN



## ESPECIES PARECIDAS

**Piquitos castaña:** con las alas abiertas, sin serie de manchas blancas en la trasera y cerrada de color más castaño. **Piquitos clara:** con las alas abiertas, dos series de manchas blancas destacadas en el ala trasera. **Piquitos:** con las alas cerradas, manchas blancas más pequeñas y venación marcada.



Piquitos castaña



Piquitos clara



Piquitos

## BIOLOGÍA Y HÁBITAT

Vuela en junio y julio, con dos generaciones anuales. Su biología es desconocida en

Málaga, pues es una especie rara y muy localizada.

Vive principalmente en entornos forestales bien conservados, a cierta altitud (entre 600 y 1100 m), ocupando praderas en claros de encinar y pinar. Las orugas se alimentan de labiadas del género *Stachys*.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## DISTRIBUCIÓN

No se ha documentado de la GSM pero puede estar presente en la etapa 11, pues ha sido observada en un entorno de características similares y relativamente cercano. También cabe la posibilidad de que aparezca en alguna etapa de la serranía rondeña.

