



Manto bicolor

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760)

DESCRIPCIÓN

Envergadura alar: 2,2 a 3 cm. **Alas abiertas:** delantera naranja brillante, con borde ancho marrón; serie de puntos recorriendo el ala; trasera marrón, con una banda naranja paralela al borde y, por encima de ésta, pequeñas manchas azuladas. Los individuos de las últimas generaciones pueden ser menos naranja y más oscuros. **Alas cerradas:** delantera naranja con puntos negros; ápice y borde trasero marrón. La trasera es marrón claro, oscureciéndose hacia el borde trasero, donde tiene una fina banda naranja, además de pequeñas manchas oscuras poco apreciables dispersas por el ala.

CLAVE VISUAL DE IDENTIFICACIÓN



ESPECIES PARECIDAS

Manto púrpura: es más grande. Abierta, el borde marrón es más estrecho, dejando ver una serie de puntos paralelo a dicho borde; trasera compeltamente naranja y punteada. Con las alas cerradas, tono general más pálido; en el ala delantera el borde marrón es sustituido por una serie de puntos; en la trasera, banda naranja más ancha y contorneada de puntos; resto del ala con multitud de puntos negros bien definidos. **Cardenillo:** en individuos poco desgastados no hay posible confusión, pues es verde. Sin embargo, con el tiempo puede perder este color, para lo cual hay que mirar el ala delantera, con manchitas blancas sobre los puntos negros, y la trasera, con manchitas blancas paralelas al borde posterior.



BIOLOGÍA Y HÁBITAT

Tiene dos o tres generaciones anuales, volando todos los meses, más abundante desde marzo a julio. Vive en todo tipo de hábitats, desde bosques y alta montaña hasta otros con escasa vegetación, como entornos rurales, eriales y campos baldíos, donde es más localizada. Las orugas se alimentan de poligonáceas, como la acedera (*Rumex acetosa*) y acederilla (*Rumex acetosella*) entre otras.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DISTRIBUCIÓN

Presente prácticamente en todas las etapas, si bien en las del norte provincial, las costeras y urbanas es más escasa y localizada, solo subsistiendo en lugares con vegetación silvestre.

