



Arlequín

Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758)

DESCRIPCIÓN

Envergadura alar: 4 a 5 cm. Tiene un vuelo errante, normalmente a ras de suelo o por encima del matorral. **Alas abiertas:** profusión de manchas amarillas, negras y, en menor cantidad, rojas, a veces estas últimas pueden estar muy desgastadas, pareciendo naranjas. Algunos individuos son de un amarillo anaranjado (forma *canteneri*). En el borde trasero de cada ala, tiene ondulaciones negras con “dientes” blancos, más pronunciadas las alas traseras. **Alas cerradas:** diseño parecido, pero el color predominante es el blanco, con manchas amarillas y negras de menor tamaño; el borde posterior de la trasera muy ondulado y con cuatro colores: blanco, negro rojo y amarillo.

CLAVE VISUAL DE IDENTIFICACIÓN

Grandes manchas blancas, rojas, negras más pequeñas y jaspeadas de amarillo



Ondulaciones muy marcadas: blanco, negro, rojo y amarillo



Manchas negras y amarillas y, en menor proporción, rojas

Borde con ondulaciones negras y “dientes” blancos

ESPECIES PARECIDAS

Macaón: de tamaño más grande, no tiene manchas rojas, posee dos apéndices en las alas traseras y tiene un vuelo más potente. **Chupaleche:** también más grande y de vuelo potente, las manchas negras son en forma de cuña y tiene dos apéndices en las alas traseras.



BIOLOGÍA Y HÁBITAT

Vuela durante casi todo el año, con dos generaciones, más abundante la de finales de invierno y primavera. Puede verse en días soleados durante el invierno. Principalmente en hábitats forestales abiertos y de matorral, sus orugas se alimentan de aristoloquia (*Aristolochia baetica*).

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DISTRIBUCIÓN

Es posible encontrarla casi en cualquier etapa, siempre que se encuentre su planta nutricia, si bien en la 1, 30 y 35, al transitar casi íntegramente por terrenos urbanos o muy transformados, es muy difícil de localizar. En los recorridos del norte de la provincia (Archidona, Antequera y Campillos) donde el aprovechamiento agrícola es muy intenso, está relegada a ríos, arroyos y otros lugares con vegetación autóctona donde medra la planta nutricia.

