



# Veloz de las rieras

*Gegenes nostradamus* (Fabricius, 1793)

## DESCRIPCIÓN

Envergadura alar: 2,5 a 3,2 cm. **Alas cerradas:** gris claro o crema claro, sin dibujos, solo a la hembra le trasluce del interior de las alas delanteras una pequeñas manchas blancas, no siempre apreciables. **Alas abiertas:** no suele mostrarse así, pero cuando lo hace presenta un color marrón oscuro, con algunas manchas blancas las hembras en las alas delanteras.

## CLAVE VISUAL DE IDENTIFICACIÓN



Manchas blancas,  
solo en hembras



Marrón oscuro,  
las hembras con  
pequeñas manchas  
blancas

## ESPECIES PARECIDAS

**Veloz fenestrada:** rara vez se deja ver de alas abiertas; cerrada, amarillenta con puntos negros, algunos con el centro blanco, en el ala trasera, mientras que en la delantera son más grandes y blancos.



## BIOLOGÍA Y HÁBITAT

Vuela durante la primavera y hasta hasta comienzos de otoño, en varias generaciones sucesivas, siendo más común durante el verano y otoño.

Su principal hábitat son los tramos bajos de ríos y arroyos que mantengan secos su cauce buena parte del año, y también sus terrazas fluviales. En menor medida, en las cada vez más escasas dunas y arenales costeros y marismas litorales. Tiene carácter migrador, por lo que se deja ver ocasionalmente en entornos urbanos, a menudo parques y jardines donde liba de plantas ornamentales. Siempre por debajo de los 400 m de altitud.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	díc
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## DISTRIBUCIÓN

Conocida de las etapas de menor altitud y costeras de la GSM, siempre escasa y muy localizada, principalmente en tramos bajos de ríos y arroyos secos o de caudal estacional. No se descarta que esté en otros lugares adecuados de las etapas del norte malagueño.

