

Familia Sturnidae

ESTORNINO NEGRO

Sturnus unicolor



IDENTIFICACIÓN

Paseriforme mediano, de plumaje absolutamente negro con tonos metalizados y reflejos ①. Muestra un aspecto compacto, con los tarsos largos y fuertes de color rosado-amarillento y la cola muy corta. El pico es puntiagudo, de color amarillo en verano y oscuro con la base gris azulada en invierno ②. Las hembras y los jóvenes en invierno presentan un moteado muy fino, difícil de percibir si no es desde cerca, en las partes inferiores y en las alas, pero no en el manto ni el píleo.

ESPECIES SIMILARES

Es muy parecido al estornino pinto, con quien coincide durante el invierno, pero este presenta un moteado muy evidente que, desde lejos, les da un aspecto marrón. El mirlo común guarda parecido también con el estornino negro, pero cuando el estornino se desplaza en el suelo lo hace erguido, sin dar saltos, lo que lo diferencia del mirlo común.

DÓNDE VERLA

Presente en muchos ambientes diferentes, mostrando preferencia por aquellos donde haya presencia humana. Bosques, terrenos agrícolas, cultivos arbolados, parques, jardines y núcleos urbanos.

CUÁNDO VERLA

ESTATUS RESIDENTE

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

