


Familia Sylviidae

CURRUCA TOMILLERA*Sylvia conspicillata***IDENTIFICACIÓN**

Es la más pequeña de las currucas. Tiene la cabeza y el manto gris azulado **1**, un anillo ocular blanco **2** y los machos bridas (entre la base del pico y el ojo) oscuras. La espalda es castaña y las partes inferiores de color crema excepto la garganta que es un tono blanco puro **3**. La cola es relativamente larga y de color oscuro, con las plumas externas blancas. Las patas son de color anaranjado y el pico es corto y fino. Las hembras son similares a los machos, pero con la cabeza pardo-rojiza y sin las bridas negras. Los jóvenes son de un tono marrón claro homogéneo.

ESPECIES SIMILARES

El macho es parecido al de la curruca zarcera, aunque con los colores mucho más intensos. Los jóvenes y las hembras son muy parecidos a los de las currucas cabecinegra, carrasqueña, zarcera o mirlona y se requiere una observación detallada para poder apreciar las sutiles diferencias en tamaño, estructura y coloración que los diferencian.

DÓNDE VERLA

Prefiere zonas de matorral bajo mediterráneo sin árboles o muy dispersos. También utiliza matorral halófilo y de alta montaña. Es menos exigente durante los pasos migratorios. No es rara en la provincia de Málaga, pero no es fácil de observar.

CUÁNDO VERLA**ESTATUS ESTIVAL**

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

