

Familia Sylviidae

# RUISEÑOR BASTARDO O CETIA RUISEÑOR

*Cettia cetti*



## IDENTIFICACIÓN

Paseriforme pequeño con las partes superiores castañas y las inferiores grises. Las alas son cortas y redondeadas, aunque esto resulta difícil de apreciar a distancia. Presenta una ceja poco llamativa de color gris ①. Las mejillas son también grises y muestra una brida un poco más oscura que las mejillas. La cola es grande y ancha, con forma de abanico ②. El pico es corto, fino y amarillento, al igual que las patas. Los machos, las hembras y los jóvenes presentan una librea muy parecida.

## ESPECIES SIMILARES

Son muchas las especies que se pueden confundir con el ruiseñor bastardo, debido sobre todo a la dificultad de obtener buenas observaciones de esta especie de costumbres discretas y que habita en zonas espesas. El canto es muy característico y útil para su identificación.

## DÓNDE VERLA

Especie ligada a la vegetación palustre, ocupando sotos, riberas, marismas, carrizales y, en general, zonas de cobertura vegetal densa cercanas al agua o umbrías.

## CUÁNDO VERLA

ESTATUS RESIDENTE

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

