

CULEBRERA EUROPEA

Circaetus gallicus



Eduardo y Javier Alba



Juan Ramírez

IDENTIFICACIÓN

Rapaz de gran tamaño con alas largas y anchas, que destaca por presentar una apariencia bastante clara, a salvedad de la garganta oscura en aves adultas y juveniles; los individuos inmaduros también presentan clara la garganta. Posada destaca por tener tarsos cortos y desnudos y una cabeza grande, que acoge unos visibles ojos amarillos. A pesar de su tamaño, es frecuente verla en vuelo cernido durante los lances de caza.

DÓNDE VERLA

Es una rapaz forestal, aunque para buscar alimento utiliza espacios abiertos y zonas con roca desnuda, donde encuentra los reptiles de los que se alimenta. En Málaga está presente durante la época reproductora prácticamente en todos los ambientes forestales, generalmente hasta los 1400 msnm y con preferencia por zonas de media montaña. Durante las dos últimas décadas comienza a estar presente también durante el invierno, aunque en cifras más bajas que el águila calzada. Esto invita a pensar en una mayor actividad invernal de su principal grupo presa, los reptiles, aunque aún no se dispone de estudios de alimentación durante los meses más fríos. En esta época las observaciones suelen estar restringidas al valle del Guadalhorce y zonas elevadas de Almogía y Pizarra, así como al sector de sierras orientales, incluidas las altas cumbres de sierra Tejeda.

CÓMO VIVE

Instala su nido siempre en árboles de cierto porte en zonas boscosas y más raramente en árboles aislados. La puesta consta únicamente de un solo huevo. Se alimenta principalmente de reptiles y suele utilizar laderas soleadas para cazar, acechando a sus presas desde posaderos elevados o cerniéndose desde el aire. Es una especie migradora de larga distancia, que pasa el invierno al sur del Sahara, aunque recientemente se han descubierto zonas de Marruecos y Argelia en las que aves no reproductoras pasan los periodos de estío.

CUÁNDO VERLA

Es frecuente observarla durante los periodos de migración, durante los meses de marzo y abril en el paso prenupcial y durante septiembre y octubre en el paso postnupcial. Durante la época reproductora también es frecuente su observación en las zonas forestales y su entorno, mientras que en invierno las observaciones son más escasas, seguramente debido al reducido número de aves que se quedan a pasar el invierno entre nosotros.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ESPECIES SIMILARES

Águila perdicera (*Aquila fasciata*) y abejero europeo (*Pernis apivorus*).