

AVES de la provincia de MÁLAGA

ÁGUILA POMERANA *Clanga pomarina*



Fotografía: Juan Ramírez Román

FENOLOGÍA

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Invernante	Invernante	Invernante	Invernante	Invernante	Estival	Estival	Residente	Residente	Migratoria	Migratoria	Migratoria

IDENTIFICACIÓN

Rapaz de tamaño (aprox. 65 cm) y envergadura (aprox. 160 cm) mediana a grande, robusta y de tonos muy oscuros. Alas anchas con los bordes paralelos. Al planear parece que las alas cuelgan levemente hacia abajo. Cola corta y ancha en su base. Adultos con plumas cobertoras superiores del ala de tono marrón más pálido que en el resto del cuerpo. Plumaje de los jóvenes más uniforme, con manchas blancas en las cobertoras y una mancha con forma de herradura clara en el obispillo. Cabeza grande pero con el pico proporcionalmente muy pequeño. Mancha de color marrón amarillento en la nuca.

DÓNDE VIVE

Especie del centro y este de Europa, pero cuya distribución alcanza hasta Asia occidental y Escandinavia. Inverna mayoritariamente en África Oriental. Evita los grandes sistemas montañosos y prefiere llanuras parcialmente arboladas y con abundancia de lagunas o marismas, tanto en sus zonas de cría como de invernada. No obstante, durante su paso migratorio puede verse en otros tipos de hábitats.

CÓMO VIVE

Especie migratoria escasa pero regular en la provincia. Utiliza los árboles para anidar, construyendo grandes nidos. La puesta suele ser de dos huevos, entre abril y mayo. Se alimenta de mamíferos de tamaño pequeño y mediano, especialmente de topillos. También consume pequeñas aves, reptiles y anfibios.

DONDE SE VE EN MÁLAGA

Ave rara y poco frecuente en Málaga que se puede ver sólo durante su paso migratorio, sobre todo durante los meses de septiembre y octubre. La mayoría de observaciones se concentra en las sierras costeras occidentales de la provincia, especialmente en el Mirador de las Águilas (Sierra Alpujata, Mijas; etapa 32 de la Gran Senda).

CURIOSIDADES

Como muchas rapaces, el águila pomerana practica el caninismo. Es decir, uno de los pollos suele mostrar una conducta agresiva que le lleva a matar a su hermano, normalmente menor que él, durante la estancia en el nido. De esta manera, sólo sobrevive un pollo, que así consigue acaparar en exclusiva el alimento y la atención de sus padres. Aunque cruel, es una estrategia de supervivencia que se manifiesta sobre todo cuando el alimento es escaso. El término *clang* deriva del latín *planga* y hace referencia a un tipo de águila que planea y se alimenta de peces.

AVES SIMILARES

Se puede confundir con el águila moteada, algo mayor y de tonos más oscuros que el águila pomerana. **Se trata de especies que se hibridan con frecuencia.** Suelen ser precisamente estos híbridos los que cruzan la Península Ibérica durante los pasos migratorios e incluso invernan regularmente en algunas localidades.