GAVIOTA SOMBRÍA

Larus fuscus

Adulta — Eduardo Alba

Inmadura — Jacinto Segura

IDENTIFICACIÓN Gaviota de apariencia muy similar a la patiamarilla (*Larus michahellis*), de la que además de, por su menor talla, se distingue sobre todo por el tono gris más oscuro en las plumas del dorso. También tiene la cabeza más redondeada y el pico más corto que la patiamarilla, aunque estas diferencias resultan difíciles de apreciar. Durante el invierno presenta la cabeza y parte posterior del cuello jaspeados. En vuelo muestran en la parte inferior del ala una banda oscura en las plumas secundarias. Además, los espejos blancos de las puntas de las alas son más reducidos que en las patiamarillas. Necesita tres años para alcanzar el plumaje de adulto y los ejemplares jóvenes e inmaduros son muy parecidos a los de las otras gaviotas grandes.

DÓNDE VERLA Especie muy abundante por todo el litoral malagueño durante su invernada. Se recomienda para su observación los puertos de Málaga y Caleta, los embalses de Guadalteba o la Laguna de Fuente de Piedra, ya que acogen grandes concentraciones de esta especie durante los meses invernales.

CUÁNDO VERLA "Invernante" y "en migración".

Puede considerarse una especie invernante en la provincia (noviembre-febrero) y también puede verse en los pasos migratorios (marzo-mayo y agosto-octubre). Un bajo número de ejemplares puede permanecer durante los meses estivales.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic

ESPECIES SIMILARES Ya se ha mencionado su gran similitud con la gaviota patiamarilla, especialmente en ejemplares inmaduros. Además de su menor tamaño y cabeza más redondeada, los jóvenes de sombría son más oscuros, sobre todo en la cara, con un pico algo más corto.