


# PARDELA BALEAR

## *Puffinus mauretanicus*



Andrés de la Cruz



Andrés de la Cruz

### IDENTIFICACIÓN

La pardela balear es bastante más pequeña que la cenicienta, con apenas 80 cm de envergadura. Esta ave marina también presenta un patrón pardo-oscuro dorsalmente y clara ventralmente. Sin embargo, por debajo, es más oscura que la pardela cenicienta. Es necesario tener en cuenta que la extensión de blanco en la barriga es muy variable en las pardelas baleares. Pico más fino que la pardela cenicienta y de color negro. Durante el vuelo, las alas y el cuerpo se alinean en forma de cruz y se desplaza con aleteos casi constantes sin apenas planear.

### DÓNDE VERLA

Al igual que la parcela cenicienta, puede verse por todo el litoral malagueño. Si el punto desde el que observamos se adentra unos metros en el mar siempre tendremos mejores avistamientos.

### CUÁNDO VERLA

Durante todo el año, aunque más abundante "en migración".

La pardela balear cría exclusivamente en las islas e islotes del archipiélago balear. Sin embargo, sus movimientos migratorios y de alimentación hace que sus avistamientos en la costa malagueña sean frecuentes. No obstante, durante los meses de mayo, junio y julio, las pardelas baleares salen del Mediterráneo tras haber criado y sus avistamientos son más fáciles desde algún promontorio con buena visibilidad del mar.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

### ESPECIES SIMILARES

Esta especie se puede confundir fácilmente con la pardela mediterránea (*Puffinus yelkouan*), las cuales fueron la misma especie hasta hace poco. La pardela balear es más oscura ventralmente mostrando siempre las plumas infracobertoras caudales (debajo de la cola) negras y un patrón bastante oscuro en las axilas, mientras que la pardela mediterránea presenta las plumas axilares más blancas y infracobertoras caudales blancas.