




CORZO MORISCO

Capreolus capreolus garganta



Identificación

Ungulado de mediano tamaño con una longitud cabeza-cuerpo de ♀110 a ♂140 cm y altura a la cruz de ♀65 a ♂75 cm, con el pelaje uniforme todo el año, de tono grisáceo o marrón rojizo. La principal diferencia entre sexos se basa en la cuerna: las hembras carecen de ella. Las crías muestran un pelaje moteado de blanco que facilita su ocultación. Los machos tienen cuernas pequeñas, 18-19 cm de longitud, ramificadas, con tres puntas (1) y que se caen (desmogue) en invierno. Es un animal esbelto y grácil, con los cuartos traseros un poco levantados y que anda a pequeños saltitos. Las hembras son ligeramente menores que los machos. Tiene grandes orejas y una cola corta, de color blanquecina en invierno y algo más amarillenta en verano (2). Presenta una mancha o bozal negra alrededor del hocico y la barbilla blanquecina (3). En Málaga está presente una subespecie conocida como “corzo morisco”, de menor tamaño que en el resto de España y carente del típico babero blanco que los demás corzos presentan en la garganta. En el corzo morisco la garganta es del mismo tono que el resto del pelaje (4).



Fenología



Reproducción



Desmogue



Celo

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dónde vive

Especie forestal con preferencia por bosques caducifolios o mixtos. Presente también en pinsapares y bosques de ribera. Utiliza especialmente los bordes forestales próximos a zonas de pastizal o a cultivos forestales (castañares, siembras de cereal en zonas serranas). Se alimenta en los bordes, siempre sin alejarse mucho del bosque. Prefiere los hábitats fragmentados, con mosaicos forestales. Requiere de cierto grado de humedad ambiental y de la presencia de agua en su entorno. Utiliza los valles fluviales como corredores de dispersión y colonización de nuevas áreas. Las masas con una gran diversidad forestal de plantas leñosas y una alta humedad ambiental se consideran hábitats óptimos como pinsapares o encinares-alcornocales-quejigares mixtos.

Cómo vive

Los corzos son ramoneadores: se alimentan de hojas y brotes tiernos de plantas leñosas, mordisqueando árboles, matorrales, zarzales y también gramíneas. Tienen un estómago pequeño, y debido a ello comen a intervalos pequeños, con breves paradas para reposar. Son animales solitarios o que viven en pequeños grupos familiares de 2 a 3 individuos, la hembra con sus crías y quizás un macho. Si el hábitat les resulta muy favorable pueden volverse gregarios, como ocurre en el norte de España. Los territorios oscilan entre 0,25 y 1,2 km² en hábitats óptimos como los pinsapares y hasta 4 km² en subóptimos como los pinares.

Cómo se reproduce

Es una especie monógama. El celo se conoce como "ladra", por el sonido que emiten los machos para marcar su territorio similar al de un perro ladrando en lo profundo del bosque. El cortejo consiste en carreras en las que los machos persiguen a las hembras, momento en el que es más fácil observarlos. Tienen un solo parto al año de una o dos crías, más frecuentemente una. Las hembras tienen la capacidad de guardar el óvulo fecundado tras el celo en estado latente y activar su desarrollo cuando el hábitat esté en un estado óptimo (implantación diferida) para que la cría tenga alimento.



Rastros


En la huella se marcan sólo dos pezuñas, pequeñas (4,5 cm de largo x 3 cm de ancho) y estrechas, más estilizadas que las de ciervo y gamo. Los excrementos son alargados (14 mm de largo x 6 mm de diámetro), brillantes y muy diferentes de los de ciervo y gamo.



ARL

Dónde se ve

Es una especie escasa en Málaga, más abundante en el extremo occidental, cerca del límite con Cádiz. Se puede observar en los Montes de Cortes, en el Monte del Duque, valles de los ríos Genal, Guadiaro, Guadares, Verde, Guadalmanza, Padrón, Guadalmina, Guadaiza y Ojén. Recientemente ha sido introducido en Sierra Tejeda. En la Gran Senda está presente, por ejemplo, en las etapas 23, 25, 26, 27, 28, 29 y 32.



Curiosidades

No es lo mismo una cuerna que un cuerno. Las cuernas como las de los corzos, ciervos y gamos son estructuras macizas y caedizas que los animales mudan todos los años. Los cuernos de cabras y muflones no se mudan, son permanentes. Forman una funda que recubre un hueso unido al cráneo. El conocido como “duende del bosque” es un animal con cuernas y es extremadamente silencioso, difícil de observar y que suele pasar desapercibido. Solamente durante el periodo de celo, por la ladra y las carreras tras las hembras, estos duendes pierden su papel discreto y se dejan ver. Le gusta la soledad y la tranquilidad. En aquellas zonas donde hay muchos cérvidos o ganado caprino, el corzo se ve limitado por la competencia y las molestias que estos animales les ocasionan.

Especies similares

Se puede confundir con las hembras de cabra montés, de las que se diferencia por ser éstas de menor tamaño y tener cuernos. También con los jóvenes y hembras de ciervos y gamos, de los que se diferencia por ser de menor tamaño y tener otro tipo de cuernas.