



# Blanca de la col

*Pieris brassicae* (Linnaeus, 1758)

## DESCRIPCIÓN

Envergadura alar: 4,9 a 6,3 cm. **Alas abiertas:** blanca con dos puntos grandes en el ala delantera (solo las hembras), con el ápice también negro, en forma de arco y bajándole por el borde hasta cerca del ángulo anal. **Alas cerradas:** ápice del ala delantera igual que en el interior, aunque de color amarillo pálido. Ala trasera igualmente amarilla pálida, con escamas negras dispersas; dos puntos negros que no siempre enseña.

## CLAVE VISUAL DE IDENTIFICACIÓN



Ápice negro en forma de arco, bajándole bastante por el borde

Fondo blanco con dos puntos negros, ausentes en los machos

Fondo blanco con dos puntos en cada ala (no siempre visibles)



Ápice de las alas amarillentas, bajándose bastante por el borde

Fondo amarillo pálido con escamas negras dispersas

## ESPECIES PARECIDAS

Blanca de la col es la más grande de todas las blancas. Sin embargo, a veces algunos individuos de talla pequeña puede ser confundida con las otras especies. **Blanquita de la col:** el ápice de las alas delanteras es gris y en ningún caso le baja tanto por el borde posterior. **Blanca catalana:** ápice negro, con forma abombada en el inicio y arqueada al final, bajándole algo por el borde posterior. **Blanca verdinervada:** tanto abierta como cerrada, la venación está contorneada de escamas oscuras, dándole un aspecto muy característico. Además, de alas abiertas la mancha del ápice es abombada y de las manchas del ala, salen igualmente escamas contorneando la venación, hasta el borde posterior.



## BIOLOGÍA Y HÁBITAT

Vuela todo el año, con varias generaciones, más abundante desde finales de invierno hasta mediada la primavera, y de nuevo en otoño y comienzos de invierno, en este caso muy dependiente de las lluvias. En todo tipo de hábitats, principalmente rurales, huertos, cultivos, incluso en pueblos y ciudades. Más escasa en entornos de montaña. Las orugas se nutren de hasta 60 especies de crucíferas, tanto silvestres como cultivadas, entre ellas jaramago y jaramago blanco (*Diplotaxis virgata* y *D. eruroides*) y mastuerzo oriental (*Cardaria draba*).

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## DISTRIBUCIÓN

Una de las mariposas más comunes de Málaga, presente en todas las etapas de la GSM. En los itinerarios litorales, los del norte provincial y los tramos más montañosos es más escasa.

