


RUISEÑOR COMÚN

Luscinia megarhynchos



MACHO

Eduardo Alba



JOVEN

Juan Luis Muñoz

IDENTIFICACIÓN

El ruisenior común presenta un plumaje dorsal homogéneo a excepción de la cola y el obispillo, que son de tonalidades rojizas. Las partes inferiores son más claras, de color crema. Suele mostrar la cola erguida y los ojos son los típicos de la familia, grandes y negros, en este caso con un anillo claro. Sin diferencias entre sexos, de los carriceros y del ruisenior bastardo podremos distinguirlos en lo fugaz de nuestras observaciones por el tamaño y por la tonalidad de su cola.

DÓNDE VERLA

Muestra preferencia por las riberas arboladas, aunque también podemos encontrarla en otros ambientes siempre que presenten zonas frescas y húmedas con matorral arbustivo, tales como bosques caducifolios, vegetación palustre de arroyos y zonas húmedas, lindes con zarzales y arbustos, grandes parques o huertos de frutales.

CÓMO VIVE

Ave migradora transahariana que es estival en la provincia. Su comportamiento es muy territorial y los machos suelen llegar antes que las hembras a los territorios de cría para marcar y defender sus zonas de reproducción con su melodioso y variado canto, que emiten día y noche. La época de reproducción comienza en abril. Construye un voluminoso nido en el suelo o sobre ramas caídas, siempre entre la maleza, con 4-5 huevos. Ave muy fiel a sus territorios de cría, donde vuelve año tras año. Alimentación insectívora, aunque también puede comer frutos.

CUÁNDO VERLA

Estival. Los primeros registros tienen lugar en el mes de marzo, aunque es en abril cuando se hace notar con su característico canto, uno de los más complejos de las aves ibéricas. Aunque la reproducción acaba en pleno verano, podemos ver ejemplares de origen más norteño, en paso por nuestra zona hasta bien entrado el mes de octubre.

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

ESPECIES SIMILARES

Cetia ruisenior (*Cettia cetti*) y los distintos carriceros (*Acrocephalus* sp.).