



Piquitos clara

Carcharodus lavatherae (Esper, 1783)


DESCRIPCIÓN

Envergadura alar: 2,5 a 3,4 cm. **Alas abiertas:** delantera marrón con amplias zonas blancas, destacando los tres puntos cuadrados, mancha central y del borde posterior; en la trasera destacan las series de manchas, las más grandes de todas las Piquitos. **Alas cerradas:** color crema muy claro con grandes manchas blancas, que a veces no son apreciables.

CLAVE VISUAL DE IDENTIFICACIÓN



Manchas igual que en el interior



ESPECIES PARECIDAS

Piquitos castaña: manchas blancas cuadradas más pequeñas y, con las alas abiertas, sustituye el blanco por castaño. **Piquitos:** con las alas abiertas, tonos más grises y rojizos en algunos casos y series de manchas blancas algo menos destacadas en alas traseras; venación blanca destacada con alas cerradas. **Piquitos serrana:** con las alas abiertas, una sola serie de manchas blancas muy destacadas en las traseras; con las alas cerradas, más oscura y manchas blancas más desarrolladas.



Piquitos castaña



Piquitos



Piquitos serrana

BIOLOGÍA Y HÁBITAT

Tiene una generación anual que vuela en junio y julio, pero es poco lo que se conoce de su biología pues es una especie muy rara y localizada en Málaga.

Vive en claros de encinar y pinsapar con matorral disperso. Las orugas se alimentan de labiadas de los géneros *Stachys* y *Sideritis*.

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DISTRIBUCIÓN

No se conoce su presencia en la GSM, pero es probable que pueda encontrarse muy localizada en algunos puntos de las etapas del arco calizo central, especialmente en la etapa 11, y de la serranía de Ronda, sobre todo en la 23.

