

CULEBRA BASTARDA

Malpolon monspessulanus



Fotografía: Luis García Cadenete

FENOLOGÍA

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Actividad

IDENTIFICACIÓN

Culebra grande, aunque no muy robusta. Es la de mayor tamaño que se puede encontrar en la provincia, pudiendo alcanzar casi 2 metros (normalmente 150 cm de longitud total). La cabeza y la cola son estrechas y alargadas. En la cabeza destacan las escamas preoculares, ya que forman una prominencia o abultamiento a modo de “ceja”, que le da un aspecto característico. Las pupilas son redondas y la escama frontal (ubicada en la zona superior de la cabeza, justo en el centro) es el doble de larga que ancha. Las escamas son lisas (sin quilla o línea media longitudinal que sobresale), sin brillo y ligeramente deprimidas en el centro. La coloración es verde uniforme en los machos adultos, con una mancha negra-cenicienta en el primer tercio del cuerpo (llamada “silla de montar”) y marrón-ocre con un moteado regular de tonos marrones, blancos y negros, en las hembras y juveniles. El vientre es blanco, con tonos sucios-amarillentos, casi siempre uniforme, en ambos sexos.

DÓNDE VIVE

Especie típica del monte mediterráneo. Ocupa casi todo tipo de formaciones con vegetación natural en ambientes cálidos y soleados. Se adapta bien a los medios alterados por el hombre y es común en el medio agrícola, así como en urbanizaciones y bordes de núcleos urbanos y pueblos pequeños.

CÓMO VIVE

Culebra de hábitos terrestres y diurnos. Le gusta tomar largos baños de sol en pedregales, majanos y muros de roca, donde también caza activamente a sus presas. Su dieta es muy variada: desde insectos (sobre todo jóvenes) hasta pollos y huevos de aves, pequeños mamíferos y otros reptiles. A veces ingiere carroña. Puede ser agresiva si se la intenta capturar, pudiendo llegar a morder. Es un ofidio opistoglofo, es decir, posee dientes especializados para inocular el veneno en el extremo posterior de la mandíbula. Son acanalados y están conectados con glándulas de veneno, pero su posición hace que difícilmente pueden inocular el veneno al hombre en caso de mordedura. Esta se considera poco peligrosa, puede producir una ligera reacción, pero es muy raro que suponga un peligro real para la persona que la sufra.

CÓMO SE REPRODUCE

La época de celo ocurre entre mayo y junio. Unos 20-30 días después del apareamiento la hembra deposita entre 3 y 15 huevos en algún lugar húmedo y soleado (bajo hojarasca, en huecos entre piedras, escombreras, bajo troncos, madrigueras de conejos o nidos de abejarucos abandonados...). Entre mediados de agosto y septiembre nacen las crías, que tienen una talla muy pequeña (20-30 cm) respecto a la de los adultos.

DÓNDE SE VE EN MÁLAGA

Especie frecuente. Es uno de los ofidios más comunes y fáciles de observar, tanto por su densidad como por su ubicuidad. Su talla y tener costumbres eminentemente diurnas ayudan a detectarla. En la provincia de Málaga es una culebra muy extendida. Aunque aparece en toda la provincia, es más frecuente en las zonas mejor conservadas (mitad occidental de la provincia y sistemas montañosos), y más escasa en los medios más alterados (campiñas agrícolas del norte, Costa del Sol...). En la Gran Senda puede observarse en todas las etapas.

CURIOSIDADES

En la cultura popular malagueña la culebra bastarda se conoce como el saetón. Una de las creencias sobre esta especie hace referencia a su capacidad de perseguir y alcanzar al desdichado que la encuentra. Y esto lo consigue al morderse la cola para formar una rueda y perseguir muy rápidamente y pendiente abajo a su víctima. Otra creencia le atribuye la costumbre de defenderse enterrando la cabeza para dar latigazos con la cola. La realidad es que se trata de un animal muy huidizo, que siempre tratará de evitar el encuentro con personas. Y sólo cuando no lo consigue mostrará su agresividad, intentando entonces asustar con bufidos y movimientos de la cabeza a quien considera su agresor. La mordedura será siempre la última opción, normalmente motivada por la imprudencia de acercarse demasiado a ella.

ESPECIES SIMILARES

Se puede confundir con los adultos de la culebra de collar, que son también verdosos y usualmente han perdido ya el collar. La culebra de collar tiene las escamas muy aquilladas, el iris anaranjado y una cabeza grande y ancha, con una escama frontal sólo un poco más larga que ancha (mucho más alargada en la culebra bastarda). Además, la "silla de montar" no está presente en la culebra de collar, que además es una especie acuática.