



Chupaleche o Podalirio

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)

DESCRIPCIÓN

Envergadura alar: 6 a 8 cm. De vuelo potente, en un primer momento puede parecer un ave. **Alas abiertas:** delantera con forma claramente triangular y grandes bandas negras, algunas con forma de cuña, sobre fondo amarillo pálido; trasera con el borde ondulado, con una banda negra y manchas azuladas en forma de medias lunas, además de dos “colas de golondrina” más largas que en Macaón. **Alas cerradas:** diseño similar al interior, pero con menos manchas negras, lo que le da un aspecto desgastado.

CLAVE VISUAL DE IDENTIFICACIÓN



ESPECIES PARECIDAS

Arlequín: de tamaño más pequeño, no tiene las "colas de golondrina", el amarillo es más intenso y tiene manchas rojas. **Macaón:** de tamaño ligeramente mayor, las manchas negras no son en forma de cuña.



Arlequín



Macaón

BIOLOGÍA Y HÁBITAT

Vuela desde finales de invierno hasta comienzos de otoño, con dos generaciones, siendo más abundante la segunda, que aparece en julio. Tiene un marcado carácter dispersivo, por lo que es posible encontrarla en cualquier hábitat, incluido el urbano, donde busca plantas ornamentales ricas en néctar. Sin embargo, prefiere entornos forestales bien conservados, amplias zonas de matorral y almendrales abandonados, pues su oruga se alimenta de las hojas del almendro (*Prunus dulcis*), además de otros árboles frutales de la familia Rosaceae, tanto silvestres como cultivados (*Prunus*, *Pyrus* y *Crataegus*).

ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DISTRIBUCIÓN

Es posible encontrarla prácticamente en cualquier etapa de la Gran Senda de Málaga, debido a su carácter dispersor, pero en las más urbanas y en la comarca norte es más difícil de localizar, estando en estos casos a menudo en torno a ríos, arroyos y cerca de almendros.

